

Прес-випуск

До дня боротьби з синдромом набутого імунodefіциту (СНІДом)

Всесвітній день боротьби зі СНІДом вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – звернути увагу суспільства на цю проблему.

За даними Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом та опортуністичними інфекціями на кінець 2017р. на диспансерному обліку перебувало 12840 громадян України з діагнозом вірусу імунodefіциту людини (ВІЛ), з яких 2799 – хворі на СНІД.

Незважаючи на широкомасштабне впровадження антивірусної терапії, ВІЛ-інфекція у 2017р. забрала життя 374 хворих, які перебували на обліку.

За 9 місяців 2018р. у місті щоденно реєструвалося в середньому 5 випадків інфікування на ВІЛ, з яких один випадок СНІДу.

У 2017р., порівняно з 2016р., показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію на 100 тис. населення міста збільшився на 4 особи і становив 60 осіб. Відповідний показник захворюваності на СНІД, зменшився на 1 особу і становив 18 осіб.

Крім того у 25 іноземних громадян виявлено ВІЛ-інфекцію, з яких 10 – хворі на СНІД.

Вікова структура зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб свідчить про те, що ВІЛ-інфекція вражає найбільш працездатну та репродуктивну вікову групу населення та дітей. У 2017р. найбільша кількість ВІЛ-інфікованих, узятих під нагляд з уперше в житті встановленим діагнозом, знаходилася у віці 25–49 років – 1297 осіб, або 75,2% від загальної кількості та діти (0–14 років) – 193 особи (11,2%).

Переважає більшість осіб, узятих під нагляд протягом 2017р. з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція (незалежно від стадії захворювання), була інфікована статевим шляхом (58,8% від загальної кількості осіб) та внаслідок уведення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом (29,9% відповідно).

Загрозливим є поширення інфекції серед жінок, що призводить до зростання ризику інфікування народжених ними дітей. Частка ВІЛ-інфікованих жінок, що перебували на обліку на кінець 2017р. становила 40,1%, з них 16,5% – хворі на СНІД.

За даними сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції за 9 місяців 2018р. було обстежено 218,2 тис. осіб. Серед обстежених, у 2845 осіб було підтверджено ВІЛ-інфекцію, а з 49,4 тис. обстежених вагітних, 87 осіб узято на диспансерний облік до Київського міського Центру профілактики та боротьби зі СНІДом та опортуністичними інфекціями.